

Children's Ear Nose & Throat Center

Sub-specialists of Dell Children's Medical Center of Central Texas

A member of the  Seton Healthcare Family

Teléfono (512) 324-2720 • Fax (512) 324-2724
Después de las horas de oficina (512) 458-1121

Cuidado posterior a la frenulectomía (bebé)

- **La frenulectomía** es un procedimiento que se realiza en la clínica para cortar el frenillo corto de la lengua con el fin de mejorar la movilidad de esta y optimizar la alimentación de los bebés.
- Dentro de las próximas 1 a 2 semanas aparecerá un área en forma de diamante de tejido blanco o amarillo debajo de la lengua. Este es un tejido cicatrizante y es lo que se espera.
- Después de la frenulectomía, las actividades de alimentación harán que la lengua se mueva lo suficiente para evitar que se vuelva a adherir. No recomendamos ningún ejercicio especial o extensión manual de la lengua. Evite poner sus dedos en la boca para evitar la contaminación de la herida. Asegúrese de que todos los biberones, chupetes y juguetes para la dentición se limpien o esterilicen adecuadamente para evitar la infección.
- Algunos bebés no padecerán mucho dolor, mientras que otros pueden sentirse mucho más molestos y a veces se niegan a alimentarse. El dolor suele mejorar 24 horas después del procedimiento. Si su pequeño tiene dificultades, intente darle Tylenol.

Tylenol infantil (160 mg / 5 ml)

Peso 6 a 11 libras: administre 1.25 ml cada 4 horas según sea necesario.

Peso 12 a 17 libras: administre 2.5 ml cada 4 horas según sea necesario.

*Si su hijo requiere más de unas pocas dosis de Tylenol, comuníquese con nuestra oficina.

Cuando debe contactar a su profesional de la salud

Si tiene alguna preocupación con respecto al sangrado, la hinchazón, la incapacidad para alimentarse después de haber intentado Tylenol, o si tiene alguna otra preocupación.