

Children's Ear Nose & Throat Center

Sub-specialists of Dell Children's Medical Center of Central Texas

A member of the  Seton Healthcare Family

Teléfono (512) 324-2720 • Fax (512) 324-2724
Después de las horas de oficina (512) 458-1121

ANOMALÍA DEL ARCO BRANQUIAL

Apreciamos esta oportunidad de atender a su hijo(a). Por favor, revise las siguientes instrucciones que le ayudarán a saber qué esperar de la cirugía de su hijo. No dude en llamarnos si tiene alguna pregunta.

¿QUÉ ES UNA ANOMALÍA DEL ARCO BRANQUIAL?

Una anomalía del arco branquial es un defecto que se desarrolla durante el primer trimestre del embarazo. Es una fosa o masa en el cuello que se puede encontrar en cualquier lugar desde la oreja hasta la clavícula. Hay tres tipos de anomalías: los quistes que son masas llenas de líquido, los senos que tienen una abertura o fosa visible en la piel, y las fístulas que tienen dos aberturas, generalmente una en el exterior que es visible, y otra en el interior. Cualquiera de ellas puede infectarse, enrojecerse, hincharse y causar dolor. Es óptimo eliminar estos defectos antes de que se infecten, si es posible.

LA CIRUGÍA

La escisión de una anomalía del arco branquial se realiza bajo anestesia general con observación nocturna en algunos casos. Su médico hablará esto con usted si cree que será necesaria la observación nocturna. Se realiza una pequeña incisión quirúrgica a través de la cual se elimina el defecto. A veces se coloca un drenaje en el sitio quirúrgico que requiere quedarse una noche. En este caso, el drenaje se retirará al día siguiente antes de que su hijo se vaya a casa. Habrá suturas disolubles para cerrar la incisión. La cirugía dura aproximadamente 1 hora y media y su hijo se irá a casa o será llevado a su habitación del hospital después de permanecer de 1 a 2 horas en la unidad de cuidados posanestésicos.

LOS CUIDADOS PREOPERATORIOS

- Evite los productos con aspirina (incluido el Pepto-Bismol) o productos que contengan Ginkgo Biloba o Hierba de San Juan durante dos semanas antes de la cirugía.
- Se puede administrar acetaminofeno (Tylenol), así como medicamentos de venta libre para el resfrío y también antibióticos.
- Por favor, notifique a su médico si hay un historial familiar de tendencias a la hemorragia o si el niño tiende a hacerse moretones con facilidad.

LAS INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS

1. Los cuidados de la herida

Limpiar la incisión quirúrgica con peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) al 50% de potencia dos veces al día (diluido con agua - mitad y mitad) y aplicar pomada antibiótica en la zona. Mantenga el lugar de la cirugía limpio y seco durante los primeros 7 a 10 días después de la operación. Vigile la incisión quirúrgica para detectar signos de infección: enrojecimiento, hinchazón, drenaje y aumento del dolor en la zona quirúrgica o a su alrededor. Notifique a la clínica si se presenta alguno de los síntomas mencionados. Una vez que la incisión haya sanado, use un protector solar de 50 SPF o más alto durante el primer verano cuando se exponga al sol, para reducir la posibilidad de cicatrices.

2. La actividad

Las actividades pueden ser reanudadas cuando su hijo se sienta bien, con la excepción de la natación, los deportes de contacto y el gimnasio, que deben ser evitados durante 7 a 10 días o hasta que el área quirúrgica esté curada y los bordes de la piel estén completamente cerrados.

3. La alimentación

No hay restricciones de alimentos ni líquidos después de esta cirugía. Tan pronto como su hijo pueda tolerar los líquidos claros y una alimentación ligera, puede reanudar una alimentación normal.

4. El dolor

Puede haber un dolor leve en el lugar de la incisión que se debe aliviar solamente con Tylenol.

CUÁNDO LLAMAR A NUESTRA CLÍNICA

Por favor, llame a la clínica o al número para después de las horas de oficina si su hijo:

- Tiene una temperatura de más de 102 F que no baje con Motrin o Tylenol
- Tiene vómitos persistentes o no puede beber líquidos
- Tiene sangrado, enrojecimiento o hinchazón en la incisión
- Tiene molestias no aliviadas por el analgésico

EL SEGUIMIENTO

Necesitaremos ver a su hijo dentro 1 a 3 semanas después de la cirugía. Por favor, llame a nuestra clínica lo antes posible para asegurarse de programar una cita dentro de ese lapso.